Collections recueillies par M. le Baron Maurice de Rothschild dans l'Afrique Orientale.

Lépidoptères : Tortricidæ, Tineidæ,

par M. Edward Meyrick.

Phalonia illota nov. sp.

♂ 12 millimètres. Tête, palpes et thorax blanchâtres, légèrement saupoudrés de gris. Ailes supérieures allongées, blanchâtre ocracé, avec stries transverses grisâtres et quelques écailles noires ; dessins ocracés, parsemés de gris ; une bande étroite médiane, parallèle au bord terminal, s'étendant à peu près du bord dorsal au-dessus du milieu de l'aile ; une tache près du bord dorsal au delà du milieu ; une bande étroite subterminale n'atteignant pas les bords ; une ligne terminale interrompue : franges grises, saupoudrées de plus foncé, blanchâtres vers la base. Ailes inférieures grisâtre clair ; franges blanchâtres, avec deux lignes grises.

1 ex., Lumbwa, en septembre.

Cnephasia mediocris nov. sp.

♂ 14 millimètres. Tête ocracé clair. Palpes gris, à extrémité ocracée. Thorax ocracé clair, antérieurement noirâtre. Ailes supérieures allongées, ocracé clair un peu mêlé de gris ; dessins gris clair violacé, bordés et marqués de brun ferrugineux foncé ; bande basilaire vague, à angle obtus sur le pli ; bande médiane oblique, précédée et suivie de stries parallèles ; un trait apical limité par une ligne descendant de la côte aux trois quarts de l'angle externe ; franges ocracé clair. Ailes inférieures gris pâle ; franges ocracé blanchâtre.

1 ex., Lumbwa, en septembre.

Ethmia epiloxa nov. sp.

♂ 17 millimètres. Tête jaune ocracé clair. Palpes grisâtres, article terminal blanchâtre. Thorax ocracé blanchâtre, extrémité postérieure, épaulettes, et une tache apicale sur les ptérygodes noirâtres. Abdomen gris clair, avec une bande jaunâtre avant le milieu ; apex jaune ocracé. Ailes supérieures allongées, grisâtre ocracé pâle ; un point noir sur le pli vers la base ; stigmates noirâtres, le plical placé obliquement avant le premier discal : franges ocracé blanchâtre. Ailes inférieures grisâtre pâle ; franges ocracé blanchâtre.

1 ex., Simba, en mars.

Tineola argocoma nov. sp.

♂ 18 millimètres. Tête et thorax blancs. Palpes grises. Antennes blanchâtres. Abdomen grisâtre pâle. Ailes supérieures allongées, assez étroites, blanc argenté; côte lisérée de noir vers la base; franges blanches. Ailes inférieures grisâtre pâle; franges blanchâtres, teintées d'ocracé vers la base.

3 ex., Simba, en mars.

Melasina olenitis nov. sp.

♂ 30 millimètres. Tête ocracé blanchâtre. Palpes squameux, ocracé blanchâtre, saupoudrés de noirâtre sauf au sommet (antennes absentes). Thorax blanchâtre, parsemé de grisâtre, antérieurement mêlé de noirâtre. Abdomen gris. Ailes supérieures allongées, grisâtre ocracé pâle, mêlées de blanchâtre, et parsemées de petits groupes d'écailles noirâtres; dessins vagues, noirâtres, une tache basilaire occupant un quart de l'aile, à bord postérieur droit, vertical, et une bande assez étroite descendant de la côte au tiers et atteignant à peu près le milieu du bord intérieur, de là se contournant au bout de la cellule. Ailes inférieures grises.

1 ex., parages du Rudolphe.

Amydria eccephala nov. sp.

♂ 20 millimètres. Tête grise. Palpes brun foncé, à deuxième article hérissé, article terminal ocracé clair. Thorax jaune ocracé, antérieurement obscurci de gris. Abdomen ocracé grisâtre pâle. Ailes supérieures allongées, assez étroites, jaune ocracé foncé; côte lisérée de noir vers la base; franges jaune ocracé. Ailes inférieures ocracé pâle, un peu grisâtre; franges ocracé pâle.

2 ex., Njoro, en avril.

Hapsifera revoluta nov. sp.

♂ 20-21 millimètres. Tête jaunâtre clair. Thorax ocracé pâle, quelquefois assombri. Palpes ocracé pâle, à deuxième article noirâtre jusqu'aux deux tiers. Ailes supérieures allongées, étroites, ocracé clair, quelquefois un peu bleuâtre; côte lisérée de noirâtre vers la base; stigmates noirs, le plical à peu près au-dessous du premier discal, quelquefois un point au-dessus du second discal, et un autre vers le milieu de la côte; franges ocracé clair. Ailes inférieures gris assez foncé; franges ocracé blanchâtre un peu grisâtre.

4 ex., Sud du lac Rudolphe et Lumbwa, en septembre.